

Medikamente, Heilmittel

Merkblatt: Haltbarkeit und Aufbrauchfristen angebrochener Arzneien

Angebrochene Arzneien müssen innerhalb bestimmter Fristen ab Anbruchdatum aufgebraucht werden. Nach abgelaufener Frist müssen sie korrekt entsorgt werden.

Arznei	Aufbrauchfrist	Besonderes, Spezielles
Augentropfen	3 Wochen	Erste 2 Tropfen jeweils verwerfen
Ohrentropfen	1 Monat	Erste 2 Tropfen jeweils verwerfen Wegwerf-Ausatz verwenden Sterilisierung (da Hautkontakt)
Salben, Crèmes, Gels usw.	3 Monate (sofern in Originalgebinde)	Kein direkter Hautkontakt Bei Verfärbung: Entsorgen
Inhalationslösungen	3 Monate (sofern in Originalgebinde)	Kein direkter Hautkontakt Bei Verfärbung oder Ausfällung entsorgen
Desinfektionslösungen	Gemäss Herstellerangaben	Umfüllung in Kleingebinde nur für unmittelbaren und einmaligen Gebrauch
Originalpackungen Medikamente	Verfalldatum	Immer in OP belassen, Originalblister, in Apotheke, auf Sterilität achten
Methadon flüssig	3 Wochen (sofern in Originalgebinde)	Immer in OP belassen, in BM-Schrank/Tresor, auf Sterilität achten
Lokalanästhetika	3 Monate (sofern in Originalgebinde)	Auf Sterilität achten
I.m, i.v. Medikamente aufgezogen in Spritze	Max. 3 Stunden	Auf Temperatur achten Bei Verfärbung oder Ausfällung entsorgen
Impfstoffe	Gemäss Herstellerangaben	Achtung kühlen!
Verbände mit Arzneien	Verfalldatum (sofern steril einzelverpackt in Originalgebinde)	Dunkel und staubfrei lagern
Verbände mit Arzneien	3 Stunden, wenn aus Steril-Verpackung genommen	Auf Sterilität achten

- Anbruchdatum muss auf Packung notiert werden.
- Hygienevorschriften beachten:
 - Handschuhe
 - Sterilität
 - Oberflächenberührung mit Öffnung des Originalgebundes vermeiden
 - Substanzdosis nur einmalig und nur für eine Person benützen
 - keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung